

(レジメン名) **GC療法 (ゲムシタビン+シスプラチン)**

[胆道癌]

		1サイクル			2サイクル
[薬剤名]		Day 1	8	15	22
ゲムシタビン	1000 mg/m ²	↓	↓		↓
シスプラチン	25 mg/m ²	↓	↓		↓

投与サイクル 3 週毎

●投与方法●

Day1	
①生食500mL+硫酸Mg0.5A (90分)	
②生食100mL+グラニセトロン3mg+デキサート3.3mg 2A(30分)	
③生食500mL(100分 シスプラチン点滴中側管より投与)	
④生食500mL+シスプラチン (90分)	
⑤生食100mL(フラッシュ)	
⑥5%ブドウ糖100mL+ゲムシタビン (30分)	
⑦生食100mL(全開で)	

(レジメン名) **GEM療法 (ゲムシタビン)**

[胆道癌]

		1サイクル				2サイクル
[薬剤名]		Day 1	8	15	22	29
ゲムシタビン	1000 mg/m ²	↓	↓	↓		↓

投与サイクル 4 週毎

●投与方法●

Day1	
①グラニセトロン3mg+生食100mL+デキサート3.3mg2A(30分)	
②ゲムシタビン +5%ブドウ糖100mL(30分)	
③生食100mL(全開で)	

(レジメン名) **キイトルーダ**

[胆道癌]

		1サイクル			2サイクル
[薬剤名]		Day 1	8	15	22
キイトルーダ	200 mg/body	↓			↓

投与サイクル 3 週毎

●投与方法●

Day1	
①生食100mL	
②キイトルーダ200mg+生食100mL(30分)	
③生食100mL	