# (レジメン名) Weekly PTX+BV療法(パクリタキセル+アバスチン)

「乳癌」

				1サイクル		2サイクル
		Day 1	8	15	22	29
パクリタキセル	90 mg/m2	<b>1</b>	$\downarrow$	$\downarrow$		<b>↓</b>
アバスチン	10 mg/kg	$\downarrow$		$\downarrow$		$\downarrow$

投与サイクル

4 週毎

# ●投与方法●

#### Dav1.15

①レスタミンコーワ(10mg)5錠, アレギサール1錠内服(ケモ30分前)

②デキサート3.3mg2A+ファモチジン1A+生食50mL (10分)

③グラニセトロン3mg+生食100mL(30分)

④パクリタキセル +5%ブドウ糖250mL(60分)

⑤生食100mL(全開で)

⑥アバスチン +生食100mL(初回90分→忍容性可能なら次回60分→忍容性可能なら次回30分)

⑦生食100mL(全開で)

#### Day8

①レスダンコーワ(10mg)5錠, アレギサール1錠内服(ケモ30分前)

②デキサート3.3mg2A+ファモチジン1A+生食50mL(10分)

③グラニセトロン3mg+生食100mL(30分)

④パクリタキセル +5%ブドウ糖250mL(60分)

⑤生食100mL(全開で)

#### (レジメン名) **EC療法(エピルビシン+エンドキサン)**

[乳癌]

				1 <del>リ</del>	イクル	2サイクル
_		Day	1	8	15	22
エピルビシン	90 mg/m2		$\downarrow$			<b>↓</b>
エンドキサン	600 mg/m2		1			$\downarrow$

投与サイクル

3 週毎

# ●投与方法●

#### Day<sup>\*</sup>

①イメンドカプセルセット(1日目125mg,2,3日目80mg)

1日目はケモ開始1時間前、2,3日目は朝食後

②ドンペリドン(10) 3T 3×N

③グラニセトロン3mg+生食100mL+デキサート6.6mg(30分)

④生食50mL+エピルビシン(全開で自然落下)

⑤生食100mL+エンドキサン (30分)

⑥生食100mL(全開で)

# (レジメン名) HER+PER療法(ハーセプチン+パージェタ)

[乳癌]

		1サイクル		2サイクル	
[薬剤名]		Day 1	8	15	22
ハーセプチン	初回 8 mg/kg	Ţ			<b>↓</b>
	2回目以降 6 mg/kg	$\downarrow$			$\downarrow$
パージェタ	初回 840 mg/body	$\downarrow$			$\downarrow$
	2回目以降 420 mg/body	$\downarrow$			$\downarrow$

投与サイクル

3 週毎

#### ●投与方法●

#### Day'

①レスタミンコーワ(10mg)5錠, アレギサール1錠内服(ケモ30分前)

②生食100mL(30分)

③ハーセプチン +生食250mL(90分)

④生食100mL(30分)

⑤パージェタ +生食250mL(60分)

⑥生食100mL(フラッシュ用)

# (レジメン名) weekly PTX療法(パクリタキセル)

[乳癌]

				1サイクル	,	2サイクル
[薬剤名]		Day 1	8	15	22	29
パクリタキセル	80 mg/m2	$\downarrow$	$\downarrow$	Ţ		$\downarrow$

投与サイクル

4 週毎

# ●投与方法●

#### Day1,8,15

①レスタミンコーワ(10mg)5錠, アレギサール1錠内服(治療開始30分以上前)

②生食50mL+ファモチジン1A+デキサート6.6mg(10分)

③グラニセトロン3mg+生食100mL(30分)

④5%ブドウ糖250mL+パクリタキセル(90分)

⑤生食100mL(全開で)

#### (レジメン名) nabPTX療法(アブラキサン)

[乳癌]

			1サイクル			2サイクル
[薬剤名]		Day	1	8	15	22
アブラキサン	260 mg/m2		$\downarrow$			$\downarrow$

投与サイクル

3 週毎

### ●投与方法●

#### Day<sup>1</sup>

①デキサート注3.3mg 2A+生食100mL(30分)

②アブラキサン+生食100mL(30分)

③生食100mL(全開で)

#### (レジメン名) HER療法(ハーセプチン)

[乳癌]

			15	サイクル	2サイクル
[薬剤名]		Day	1 8	15	22
ハーセプチン	初回 8 mg/kg		Ţ		1
	2回目以降 6 mg/kg		<b></b>		<b>↓</b>

投与サイクル 3 週毎

# ●投与方法●

#### Day1

- ①レスタミンコーワ(10mg)5錠,アレギサール1錠内服(点滴30分前)
- ②生食100mL(30分)
- ③生食250mL+ハーセプチン(90分)

初回投与の忍容性良好なら2回目以降60分→30分まで短縮可能

④生食100mL(フラッシュ用)

#### (レジメン名) ハラヴェン療法

[乳癌]

				1サイクル		2サイクル
[薬剤名]			Day 1	8	15	22
ハラヴェン		1.4 mg/m2	$\downarrow$	↓		<b>↓</b>
投与サイクル	3 週毎					

#### ●投与方法●

- ①グラニセトロン(3)+デキサート(3.3)2A+生食100mL(30分)
- ②生食35mL+ハラヴェン(5分)
- ③生食100mL

# (レジメン名) HER+PER+DTX療法(ハーセプチン+パージェタ+ドセタキセル)

[乳癌]

		1サイクル		2サイクル	
[薬剤名]		Day 1	8	15	22
ハーセプチン	初回 8 mg/kg	1			↓
	2回目以降 6 mg/kg	$\downarrow$			$\downarrow$
パージェタ	初回 840 mg/body	$\downarrow$			$\downarrow$
	2回目以降 420 mg/body	$\downarrow$			$\downarrow$
ドセタキセル	75 mg/m2	$\downarrow$			$\downarrow$

3 週毎 投与サイクル

#### ●投与方法●

#### Day1

- ①レスタミンコーワ(10mg)5錠, アレギサール1錠内服(ケモ30分前)
- ②生食100mL(30分)
- ③ハーセプチン +生食250mL(90分)
- ④生食100mL(30分)
- ⑤パージェタ +生食250mL(60分)
- ⑥デキサート(3.3)2A+生食100mL(30分)
- ⑦ドセタキセル +5%ブドウ糖250mg(60分)
- ⑧生食100mL(フラッシュ用)