

(レジメン名) R-CHOP療法 (リツキサン+エンドキサン+アドリアシン+オンコビン+プレドニン)

		1サイクル				2サイクル	
[薬剤名]		Day 1	2	8	15	22	23
リツキサン	375 mg/m ²	↓				↓	
エンドキサン	750 mg/m ²		↓				↓
アドリアシン	50 mg/m ²		↓				↓
オンコビン	1.4 mg/m ²		↓				↓
プレドニン	100 mg	day1-5				day22-26	

投与サイクル 3 週毎

●投与方法●

<p>Day1</p> <p>①生食500mL (24時間維持)(本体)</p> <p>②生食100mL+プレドニン100mg (120分)側管</p> <p>③カロナール錠300mg内服、ポラミン1A静注(リツキサン開始30分前)</p> <p>④生食500mL+リツキサン 側管(10倍希釈) 最初25mL/hr→ 1時間後100mL/hrに速度変更 →さらに1時間後200mL/hrに速度変更</p> <p>⑤生食100mL(リツキサン終了後、側管洗浄用)</p>
<p>Day2</p> <p>①生食100mL+グラニセトロン3mg+プレドニン100mg (120分)</p> <p>②生食100mL+エンドキサン (60分)</p> <p>③生食100mL+アドリアシン (60分)</p> <p>④生食100mL+オンコビン (120分)</p> <p>⑤ビーフリード 500mL</p>
<p>Day3</p> <p>①生食100mL+プレドニン100mg (50mL/hr)</p>
<p>Day4,5</p> <p>①プレドニゾロン錠 (5) 20錠 1日3回毎食後(朝10-昼5-夕5)</p>