

(レジメン名) **オブジーボ療法**

[胃癌]

[薬剤名]	Day	1サイクル		2サイクル
		1	8	15
オブジーボ	240 mg/body	↓		↓

投与サイクル 2 週毎

●投与方法●

Day1
①生食100mL(ルート確保)
②オブジーボ240mg+生食86mL(220mL/hr)
③生食100mL(フラッシュ用)

(レジメン名) **weekly PTX療法 (パクリタキセル)**

[胃癌]

[薬剤名]	Day	1サイクル				2サイクル
		1	8	15	22	29
パクリタキセル	60 mg/m2	↓	↓	↓		↓

投与サイクル 4 週毎

●投与方法●

Day1,8,15
①レスタシノーワ(10mg)5錠, アレキサール1錠内服(治療開始30分以上前)
②生食50mL+ファモチジン1A+デキサート6.6mg(10分)
③グラニセトロン3mg+生食100mL(30分)
④5%ブドウ糖250mL+パクリタキセル (90分)
⑤生食100mL(全開で)

(レジメン名) **SP療法 (S-1+シスプラチン)**

[胃癌]

[薬剤名]	Day	1サイクル					2サイクル
		1	8	15	22	29	36
S-1	80 mg/m2						
シスプラチン	60 mg/m2		↓				

投与サイクル 5 週毎

●投与方法●

Day1-21
①S-1 経口 1日2回朝夕食後 3週間投与2週間休薬

Day8
①イメンドカプセル125mg
②フイジオ140 (250mL/hr)
③フイジオ140 (250mL/hr)
④アロキシ0.75mg1A+デキサート6.6mg+生食100mL(200mL/hr)
⑤ラシックス1A (前後フラッシュ用生食シリンジ1本)
⑥シスプラチン +生食500mL(320mL/hr)
⑦フイジオ140(250mL/hr)
⑧フイジオ140(250mL/hr)
⑨フイジオ140(250mL/hr)

Day9
①イメンドカプセルカプセル80mg
②デキサート6.6mg+生食100mL(200mL/hr)
③フイジオ140(250mL/hr)
④フイジオ140(250mL/hr)
⑤フイジオ140(250mL/hr)

Day10
①イメンドカプセルカプセル80mg

(レジメン名) **weekly nab-PTX+RAM療法 (アブラキサン+サイラムザ)** [胃癌]

		1サイクル				2サイクル
[薬剤名]		Day 1	8	15	22	29
サイラムザ	8 mg/kg	↓		↓		↓
アブラキサン	100 mg/m ²	↓	↓	↓		↓

投与サイクル 4 週毎

●投与方法●

Day1,15
①レスタシコー7(10mg)5錠, アレギサー1錠内服(治療開始前) ②グラニセトロン(3)1A+デキサート(3.3)2A+生食100mL(30分) ③生食250mL+サイラムザ (60分) ④生食100mL(30分経過観察) ⑤生食100mL(必要量以外抜いて廃棄)+アブラキサン (30分) ⑥生食100mL(フラッシュ用)
Day8
①グラニセトロン(3)1A+デキサート(3.3)2A+生食100mL(30分) ②生食100mL(必要量以外抜いて廃棄)+アブラキサン (30分) ③生食100mL(フラッシュ用)

(レジメン名) **S-1+DTX療法 (S-1+ドセタキセル)** [胃癌]

		1サイクル			2サイクル
[薬剤名]		Day 1	8	15	22
S-1	80 mg/m ²				
ドセタキセル	40 mg/m ²	↓			↓

投与サイクル 3 週毎

●投与方法●

Day1
①S-1錠 1日2回 朝夕食後 2週間投与1週間休薬 ②グラニセトロン3mg+生食100mL+デキサート3.3mg2A(30分) ③5%ブドウ糖250mL+ドセタキセル(60分) ④生食100mL

(レジメン名) **XP+HER療法 (ゼローダ+シスプラチン+ハーセプチン)** [胃癌]

[薬剤名]		Day	1サイクル		2サイクル
			1	8	15
ゼローダ	2000 mg/m ²		■		■
シスプラチン	80 mg/m ²		↓		↓
ハーセプチン (初回)	8 mg/kg		↓		↓
(2回目以降)	6 mg/kg		↓		↓

投与サイクル 3 週毎

●投与方法●

<p>Day1</p> <p>①イメンドカプセル125mg ②レスタミンコ-75錠、アレギサール1錠 ③アロキシ0.75mg1A+デキサート6.6mg+生食100mL(30分) ④生食250mL+ハーセプチン (初回90分、忍容性良好なら2回目以降30分まで短縮可) ⑤生食500mL(90分) ⑥フィジオ140(90分) ⑦ラシックス1A (前後フラッシュ用生食シリンジ1本) ⑧シスプラチン +生食500mL(120分) ⑨フィジオ140(120分) ⑩フィジオ140(120分) ⑪ゼローダ錠 1日2回 朝夕食後 2週間投与1週間休薬</p>
<p>Day2</p> <p>①イメンドカプセルカプセル80mg ②デキサート6.6mg+生食100mL(30分) ③フィジオ140(120分) ④フィジオ140(120分) ⑤フィジオ140(120分)</p>
<p>Day3</p> <p>①イメンドカプセルカプセル80mg ②デキサート6.6mg+生食100mL(30分) ③フィジオ140(120分) ④フィジオ140(120分) ⑤フィジオ140(120分)</p>